

患者氏名 性別 男・女 生年月日 T S H 年 月 日 (才)

IFN開始病院名 入院期間 年 月 日 ~ 年 月 日

IFN登録医療機関 かかりつけ医療機関

セログループ(Genotype) HCV-RNA量 ①初回 ①1(1a又は1b) ①高(≥100KU/mL) ②再投与 ②2(2a又は2b) ②低(<100KU/mL)

治療薬剤 ①PEG-IFN+リバビリン併用療法 ②PEG-IFN単剤療法 治療期間 ①24週 ②48週 ③72週(その他)

合併症 ①糖尿病 ①高血圧 ①心疾患 ①自己免疫疾患 ①甲状腺疾患 (その他)

体重 kg

① ペガシス(90・180/μg) ペグイントロン(50・100・150/μg) 投与量 使用薬剤 投与量 使用バイアル 液量(mL) 投与方法 回数/週 期間

IFN投与日 ()年()月()日 ~ ()年()月()日

② リバビリン併用療法(使用薬剤) 使用薬剤 投与量(1日量) 服薬方法 服薬用法 回数/週 期間

ペグイントロン投与量の目安 体重(kg) 投与量(μg) 使用バイアル 液量(mL)

ペガシス投与量 180μg

レベートル・コペガス投与量の目安 体重(kg) 投与量(日) 60kg以下 600mg 60kg~80kg 800mg 80kg以上 1000mg

Main clinical data table with columns for medical institutions, lab tests (Hb, Hct, ALT, HCV-RNA), and clinical symptoms (fatigue, pain, etc.) over 24 weeks.

病院 (治療終了後) 4 8 12 16 20 24 週目 日付 白血球 好中球 ヘモグロビン 血小板 ALT HCV-RNA

平成 年 月 日 病院 主治医 (グループ)

緊急連絡先 科 電話 (072) - 産 電話 (072) -