

患者氏名 性別 生年月日 T S H 年 月 日 (才)

IFN開始病院名 入院期間 年 月 日 ~ 年 月 日

IFN登録医療機関 かかりつけ医療機関

セログループ(Genotype) HCV-RNA量 初回 再投与

治療薬剤 治療期間 ①PEG-IFN+リパビリン併用療法 ②PEG-IFN単剤療法

合併症 糖尿病 高血圧 心疾患 自己免疫疾患 甲状腺疾患 (その他)

体重 kg

① ペガシス(90・180/μg) ペグイントロン(50・100・150/μg) 投与量 使用薬剤 投与量 使用バイアル 液量(mL) 投与方法 回数/週 期間

IFN投与日 ()年()月()日 ~ ()年()月()日

② リパビリン併用療法(使用薬剤) 使用薬剤 投与量(1日量) 服薬方法 服薬用法 回数/週 期間

ペグイントロン投与量の目安 体重(kg) 投与量(μg) 使用バイアル 液量(mL)

ペガシス投与量 180μg

レベトール・コペガス投与量の目安 体重(kg) 投与量(日)

Table with 24 columns (days) and multiple rows (lab tests, symptoms, status). Rows include: 検査 (白血球, 好中球, ヘモグロビン, 血小板, ALT, HCV-RNA), ペガシス, ペグイントロン, IFN単剤, レベトール, コペガス, 活動・食事・清潔, 主訴及び症状, 症状, 全身状態及び投与局所状態, 精神・神経症状, 消化器症状, 筋・骨格症状, 呼吸, 皮膚, 腎, 目・耳障害, その他.

病院 (治療終了後) 4 8 12 16 20 24 週目

平成 年 月 日 病院 主治医 (グループ)

緊急連絡先 科 電話 (072) - 産 電話 (072) -